

Landi



### Pour lutter contre la mouche de la cerise

Pour réduire l'infestation, plusieurs pièges à appâts contre la mouche de la cerise doivent être suspendus à une distance de 2 m à 3 m à proximité immédiate ou dans la culture en cas d'infestation. Les pièges à appâts doivent être placés à la hauteur de la base des fruits. Le liquide attractif doit être renouvelé au plus tard après quatre semaines. Ne pas vider le liquide attractif dans la culture ou le compost, mais dans l'évier. Les fruits infestés ne doivent pas être jetés dans le compost, mais dans les ordures ménagères.

Numéro d'article 71169

### Caractéristiques du produit

Verser le contenu du flacon de 50 ml dans le piège. Refermer le couvercle et le suspendre à l'endroit souhaité.

Pour réduire l'infestation, plusieurs pièges à appâts contre la mouche de la cerise doivent être suspendus à une distance de 2 m à 3 m à proximité immédiate ou dans la culture en cas d'infestation. Les pièges à appâts doivent être placés à la hauteur de la base des fruits. Le liquide attractif doit être renouvelé au plus tard après quatre semaines. Ne pas vider le liquide attractif dans la culture ou le compost, mais dans l'évier. Les fruits infestés ne doivent pas être jetés dans le compost, mais dans les ordures ménagères.

### Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2026