









Aperçu de la lutte contre les ravageurs avec des champignons

| Parasite | Dégâts | Période de lutte | Auxiliaire | Produit LANDI | Remarque |
|--|--|------------------|---|--|---|
| <p>Ver blanc du hanneton commun</p>  <p>Insecte adulte</p>  <p>★ Larve</p> |  | Avril à octobre | Champignon (<i>Beauveria brongniartii</i>) |  <p>Melocont</p> | <p>Attention: il y a un risque de confusion entre les larves du ver blanc du hanneton de la Saint-Jean commun et celles du ver blanc du hanneton horticole.</p> <p>La larve mesure entre 2,5 et 3,5 cm de long et rampe sur le flanc sur les surfaces lisses.</p> |
| <p>Ver blanc du hanneton de la Saint-Jean</p>  <p>Insecte adulte</p>  <p>★ Larve</p> |  | Avril à octobre | Champignon (<i>Metarhizium anisopliae</i>) |  <p>GranMet</p> | <p>Attention: il y a un risque de confusion entre les larves du ver blanc du hanneton commun et celles du ver blanc du hanneton horticole.</p> <p>La larve mesure entre 2 et 3,5 cm et rampe sur le ventre sur les surfaces lisses.</p> |

★ Provoquent des dégâts sur les plantes