


Übersicht Schädlingsbekämpfung mit Nematoden

Schädling	Schaden	Bekämpfungszeit	Nützling	LANDI Produkt	Bemerkung
Dickmaulrüsslerlarven  Adultes Insekt Larve		März bis Mai und August bis Oktober	Nematoden <i>(Heterorhabditis bacteriophora)</i>	 Nematop	Die Blätter werden von den adulten Insekten befallen. Der grössere Schaden wird jedoch durch die Larven an den Wurzeln der Pflanzen verursacht.
Erdräupen  Adultes Insekt Larve		Juni bis September	Nematoden <i>(Steinernema carpocapsae)</i>	 Nemastar	Angefressen werden mit Vorliebe Wurzelhalse von beispielsweise Karotten, Lauch oder auch Kartoffeln.
Werren  Adultes und junges Insekt		April bis Juli	Nematoden <i>(Steinernema carpocapsae)</i>	 Nemastar	Verursachen häufig Schäden an Gemüse.
Wiesenschnakenlarven  Adultes Insekt Larve		September bis Oktober	Nematoden <i>(Steinernema carpocapsae)</i>	 Nemastar	
Gartenlaubkäferengerlinge  Adultes Insekt Larve		Mitte Juli bis Ende September	Nematoden <i>(Heterorhabditis bacteriophora)</i>	 Nemagreen	Achtung es besteht Verwechslungsgefahr mit den Larven der Mai- und Junikäferengerlingen. Die Larve ist bis 1,5 cm lang und bewegt sich in Bauchlage auf glatter Oberfläche fort.

★ Verursachen den Schaden an den Pflanzen