

Nouveaux semis

Les nouveaux semis se développeront bien, à condition que la préparation du sol, l'ensemencement et aussi les soins ultérieurs fassent l'objet d'une attention particulière.

Lisez ici comment vous obtiendrez progressivement une belle pelouse saine.

Moment approprié



Les graminées germent mieux à des températures comprises entre 15 et 25 °C. Le moment approprié pour l'ensemencement sera donc au printemps ou en automne.

mi-avril – début juin

mi-août – début octobre



Préparation du sol



Retourner la terre, égaliser ensuite grossièrement avec une griffe et laisser tasser durant deux semaines au moins. Pour effectuer le nivellement fin, éliminer les pierres, les racines et les mottes avec un râteau à pelouse.

Le lit de semis doit être stable avant tout traitement ultérieur.

Nouveau semis



Partager le mélange de semences et semer en deux étapes, en croisant et uniformément.

Respecter la quantité recommandée de semence du produit. Des quantités plus grandes ne donnent pas de meilleurs résultats!

L'engrais d'ensemencement favorise la croissance des germes accumulés.



Sarcler superficiellement les graines de graminées (max. 1 cm de profondeur) et tasser avec un rouleau. Cela assure un bon contact des semences avec le sol. Une pelle à neige peut aussi être utilisée à la place d'un rouleau.

Arrosage



A partir des semailles et durant deux à trois semaines, arroser des petites quantités d'eau jusqu'à trois fois par jour. Important: le sol ne doit jamais être sec durant la phase de germination!

Arroser plus rarement lorsque la couche végétale est épaisse, cependant jusqu'à une profondeur de 10-15 cm.

Faucher



Il est inévitable que des semences de mauvaises herbes existantes dans le sol germent simultanément avec des semences de gazon.

La première coupe sert de coupe d'entretien. Elle sera effectuée lorsque l'herbe aura atteint une hauteur de 8 cm environ. La hauteur de coupe idéale est de 3,5 à 4,5 cm. Pour les coupes futures, la règle suivante sera respectée: enlever seulement 1/3 de longueur de lame avec un intervalle de coupe de une à deux semaines.